

Neue 18a-  
Genehmigungen für Gemüsekulturen

Von der Genehmigungsbehörde wurden neue Genehmigungen nach § 18a Pflanzenschutzgesetz für verschiedene Gemüsekulturen erteilt, die Johannes Keßler von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Pflanzenschutzdienst, in einer Tabelle zusammengestellt hat. (Quelle: LWK NRW) [ts]

| Kultur (Bereich)                    | Präparat (Wirkstoff)      | Aufwand             | Anwendung   | Wartezeit  |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|------------|
| Bundzwiebel (Freiland)              | Select 240 EC (Clethodim) | 1 x<br>0,75 l/ha    | Gegen einkeimblättrige Unkräuter einschl. Einjähriges Rispengras;<br>Nach Auflauf der Kultur; in Mischung mit 1,5 l/ha Para-Sommer) | 35<br>Tage |
| Endivien (Gewächshaus)              | Vertimec (Abamectin)      | 4 x<br>0,5 l/ha     | Gegen Minierfliegen;<br>bei Befallsbeginn   | 14<br>Tage |
| Feldsalat (Gewächshaus)             | Steward (Indoxacarb)      | 3 x<br>85 g/ha      | Gegen freifressende Schmetterlingsraupen;<br>bei Befallsbeginn  | 14<br>Tage |
| Gurke (Gewächshaus)                 | Steward (Indoxacarb)      | 3 x<br>85 -170 g/ha | Gegen freifressende Schmetterlingsraupen;<br>bei Befallsbeginn;<br>Wasseraufwand 600 – 1200 l/ha                                    | 3<br>Tage  |
| Kohlrabi (Freiland und Gewächshaus) | Steward (Indoxacarb)      | 2 x<br>85 g/ha      | Gegen freifressende Schmetterlingsraupen;<br>bei Befallsbeginn  | 3<br>Tage  |
| Salate (Gewächshaus)                | Vertimec (Abamectin)      | 4 x<br>0,5 l/ha     | Gegen Minierfliegen;<br>bei Befallsbeginn   | 14<br>Tage |
| Porree (Freiland)                   | Buctril (Bromoxynil)      | 1 x<br>1,5 l/ha     | Einjährige 2-keimblättrige Unkräuter;<br>Anwendung nach dem Auflaufen (2.-9. Blatt) oder nach dem Pflanzen                          | F          |

|   |                                     |                     |   |            |
|---|-------------------------------------|---------------------|---|------------|
| Radieschen,<br>Rettich<br>(Freiland)                  | Fusilade Max<br>(Fluazifop-P)       | 1 x<br>1,5 l/ha     | Gegen einkeimblättrige Unkräuter bis Bestockungsbeginn (ausgen. Einjähriges Rispengras) Nachauf-<br>laufenanwendung                 | 28<br>Tage |
| Radieschen,<br>Rettich<br>(Freiland)                  | Steward<br>(Indoxacarb)             | 2 x<br>85 g/ha      | Gegen freifressende Schmetterlingsraupen;<br>bei Befallsbeginn  | 3<br>Tage  |
| Schnittmangold,<br>Stielmangold<br>(Freiland)         | Karate Zeon<br>(Lambda-Cyhalothrin) | 1 x 0,075 l/ha      | Gegen saugende und beißende Insekten; bei Befallsbeginn   | 14<br>Tage |
| Spargel<br>- Jung- und Ertragsanlagen -<br>(Freiland) | Calypso<br>(Thiacloprid)            | 2 x<br>0,2 l/ha     | Gegen Blattläuse;<br>ab Befallsbeginn, in Ertragsanlagen jedoch erst nach der Ernte;<br>Wasseraufwand 400 – 1200 l/ha               | F          |
| Spargel<br>(Freiland)                                 | Buctril<br>(Bromoxynil)             | 1 x<br>1,5 l/ha     | Gegen Amaranarten, Spreizende Melde, Schwarzer Nachtschatten;<br>Anwendung nach der Stechperiode als Unterblattbehandlung           | F          |
| Tomate<br>(Gewächshaus)                               | Steward<br>(Indoxacarb)             | 3 x<br>85 -170 g/ha | Gegen freifressende Schmetterlingsraupen;<br>bei Befallsbeginn;<br>Wasseraufwand 600 – 1200 l/ha                                    | 3<br>Tage  |
| Zuckermais<br>(Freiland)                              | Buctril<br>(Bromoxynil)             | 1 x<br>1,5 l/ha     | Gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, im 4-6-Blattstadium der Unkräuter;<br>Anwendung nach dem Auflaufen der Kulturpflanzen | 60<br>Tage |

|  |                         |                 |   |            |
|--|-------------------------|-----------------|---|------------|
| Zwiebelgemüse<br>- Bundzwiebel u.<br>Speisezwiebel<br>ohne Blatt -<br>(Freiland) | Buctril<br>(Bromoxynil) | 1 x<br>1,0 l/ha | Gegen einjährige<br>zweikeimblättrige<br>Unkräuter, im 1-<br>3-Blattstadium<br>der Unkräuter;<br>Anwendung nach<br>dem Auflaufen<br>der Kulturpflan-<br>zen | 28<br>Tage |
|--|-------------------------|-----------------|---|------------|



[www.taspo.de](http://www.taspo.de)